

Reciba la vacuna del COVID-19

Revise esta información detenidamente. Avise al vacunador si tiene alguna pregunta.

Lo que debe saber sobre la vacuna del COVID-19:

- Recibir todas las dosis recomendadas de la vacuna del COVID-19, incluyendo las dosis de refuerzo, da una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte por infección del COVID-19.
- Se recomienda la vacunación incluso después de haber tenido una infección por COVID-19 y puede fortalecer la protección contra las variantes actuales y futuras del virus.
- Reciba su próxima dosis en el intervalo recomendado cuando sea posible. Si necesita protección antes, puede recibir la vacuna en el intervalo mínimo más corto. Se recomienda un intervalo más largo, ya que se ha mostrado que produce una mejor respuesta inmunitaria comparado con un intervalo más corto.



Para niños de 6 meses a 11 años:



- Los niños deben recibir todas las dosis recomendadas de la vacuna del COVID-19. Esto es especialmente importante para los niños que tienen condiciones médicas subyacentes.
- Las vacunas del COVID-19 de Pfizer y Moderna para niños usan una dosis más pequeña que las vacunas del COVID-19 para adultos. Una dosis más baja funciona porque los niños tienen una respuesta inmunitaria más fuerte que los adultos.
- Los niños de seis meses o más pueden recibir su vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo, antes o después que otras vacunas.
- Para obtener más información, incluyendo recursos y estrategias sobre cómo ayudar a su hijo a prepararse para la vacunación, visite halton.ca/COVIDvaccines4kids.

¿Qué esperar después de recibir la vacuna del COVID-19?:

¿Qué debo hacer inmediatamente después de recibir la vacuna?

Espere de **5 a 15 minutos** para asegurarse de que se siente bien. Es posible que le pidan que espere **30 minutos** si hay alguna preocupación sobre una posible alergia a la vacuna.

Los proveedores de vacunas están capacitados para detectar alergias y dar atención inmediata si tiene una reacción alérgica. Avise a su vacunador si tiene una historia de alergias graves o desmayos después de recibir la vacuna.



Informe al personal de la clínica si no se siente bien o si tiene alguno de estos síntomas:



Urticaria
(bultos en la piel que producen picazón)



Dificultad para respirar



Hinchazón en la cara, la lengua o la garganta



Mareos

Síntomas frecuentes después de recibir la vacuna:

En el lugar donde recibió la vacuna:

- Dolor, enrojecimiento o hinchazón

Nota: El dolor, el enrojecimiento y la hinchazón pueden aparecer muchos días después de recibir la vacuna. Generalmente no son graves y desaparecen por sí solos.



Otros síntomas:

- fiebre
- escalofríos
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor en los músculos/las articulaciones

Los niños de seis meses a menos de dos años pueden tener:

- irritabilidad/llanto
- somnolencia
- pérdida del apetito



Riesgos poco frecuentes de la vacuna del COVID-19:

Las reacciones alérgicas a la vacuna y otros efectos secundarios graves son poco frecuentes. Aunque no es lo habitual, hay un pequeño riesgo de desarrollar lo siguiente después de recibir una vacuna del COVID-19: parálisis de Bell, miocarditis/pericarditis, anafilaxia o síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C/A). Comuníquese con su médico si tiene alguno de los síntomas de abajo. Los síntomas pueden aparecer dentro de una semana o más después de recibir la vacuna. Si los síntomas son graves, llame al 911.

- urticaria o picazón de la piel
- hinchazón en la cara o en la boca
- dificultad para respirar o pitido en el pecho
- somnolencia grave
- fiebre alta (más de 40 °C)
- convulsiones o ataques
- debilidad muscular/pérdida de sensibilidad en la cara
- dolor en el pecho, falta de aire o sudoración excesiva
- sensación de latidos rápidos, fuertes o agitados
- otros síntomas graves (por ejemplo, "hormigueo" o adormecimiento)



Para obtener más información sobre la vacuna del COVID-19, visite halton.ca/COVIDvaccines.