

(COVID-19) ما ينبغي توقعه بعد تلقي لقاح فيروس كورونا



ما الذي ينبغي أن أقوم به بعد تلقي اللقاح؟

انتظر لمدة **15 دقيقة** بعد تلقي اللقاح للتأكد من عدم وجود آثار جانبية للقاح. خلال تلك الفترة، لا تقد أي مركبة أو أي من وسائل النقل. يمكن أن يُطلب منك الانتظار لمدة **30 دقيقة** إن كانت هناك مخاوف بشأن احتمالية حدوث حساسية من اللقاح.

أبلغ طاقم العيادة إذا شعرت بتوسعك أو ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:



الدوار



تورم وجهك، أو لسانك، أو حلقك



صعوبة التنفس



الشرى (نتوءات في الجلد تسبب الهرش)

ما الذي يمكن أن أتوقعه أثناء الأيام القليلة التالية؟


في بقية أنحاء جسمك:

- الحمى
- القشعريرة
- التعب
- الصداع
- ألم العضلات/المفاصل



في الذراع التي تلقيت فيه اللقاح:

- الألم
- الاحمرار أو التورم



متى ينبغي عليك أن تتصل بالطبيب؟

حدوث تفاعلات الحساسية إزاء اللقاح نادرة، ولكنها يمكن أن تحدث خلال مدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد تلقي اللقاح. اتصل بالطبيب إذا أصبت بأي من الأعراض المذكورة أدناه: إذا كانت أعراضك شديدة، فاتصل بالرقم 911.

- الحمى العالية (أعلى من 40 درجة مئوية)
- التشنجات أو النوبات الصرعية
- الأعراض الخطيرة الأخرى (مثل الإحساس بما يشبه وخز "الإير والمسامير" أو التتميل)
- الشرى
- تورم الوجه أو الفم
- صعوبة التنفس
- الشحوب الشديد والدوار الخطير



أشياء ينبغي تذكرها بعد تلقي اللقاح



لا تتلقَ أي لقاحات أخرى لمدة 28 يومًا من كل جرعة (ما لم يوص الطبيب بذلك).




داوم على اتباع إجراءات الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

تلقي جرعتك الثانية من لقاح فيروس كورونا (COVID-19)

تتوقف المدة بين جرعتك الأولى والثانية على اللقاح الذي تلقيته وعلى توجيهات الصحة العامة.

- ينبغي أن تتلقى جرعة ثانية من نفس اللقاح الذي سبق لك تلقيه.
- احتفظ بهذه النشرة وبيصال مطبوع لتطعيم فيروس كورونا (COVID-19) من يوم تلقيك للقاح في مكان آمن.
- أحضر إيصال تطعيم فيروس كورونا (COVID-19) معك لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.



المزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات والتحديثات، تفضل بزيارة halton.ca/COVID19 أو اتصل بالرقم 311.

