

الحصول على لقاح COVID-19 الخاص بك

يُرجى مراجعة هذه المعلومات بعناية. أخبر من يعطيك التطعيم عما إذا كان لديك أسئلة.

ما الذي تحتاج إلى معرفته حول لقاح فيروس COVID-19:



- يوفر الحصول على جميع الجرعات الموصى بها من لقاح Covid-19، بما في ذلك الجرعات المنشطة، حماية قوية ضد المرض الشديد، وتجنب الخضوع للعلاج بالمستشفى والوفاة من جراء الإصابة بعدوى Covid-19.
- لا يزال يوصى بالتطعيم بعد إصابتك بعدوى Covid-19 وقد يعزز الحماية ضد المتحورات الحالية والمستقبلية للفيروس.
- احصل على جرعتك التالية في الموعد الموصى به عندما يكون ذلك ممكنًا. إذا كنت بحاجة إلى الحماية من العدوى بصورة عاجلة، فيمكنك الحصول على لقاحك في فترة أقصر وبأقل فاصل زمني. يوصى بأن يكون هناك فواصل زمنية أطول بين التطعيمات حيث ثبت أن هذا الأمر يؤدي إلى استجابة مناعية أفضل مقارنة بالفواصل الزمنية الأقصر.

للأطفال من سن 6 شهور إلى 11 عامًا:

- يجب أن يحصل الأطفال على جميع الجرعات الموصى بها من لقاح Covid-19. يتسم هذا الأمر بأهمية بالغة للأطفال الذين يعانون من مشاكل طبية أساسية.
- يحصل الأطفال على جرعات أقل من لقاحات فايزر وموديرنا المضادة لفيروس Covid-19 مما يحصل على البالغين. سيسري مفعول الجرعة الأقل لأن الأطفال لديهم استجابة مناعية أقوى من البالغين.
- يُمكن للأطفال بعمر ستة أشهر أو أكبر تلقي لقاح كوفيد-19 الخاص بهم في الوقت نفسه قبل اللقاحات الأخرى أو بعدها.
- لمزيد من المعلومات بما في ذلك الموارد والاستراتيجيات حول كيفية مساعدة طفلك على الاستعداد للحصول على اللقاح، باءر بزيارة halton.ca/COVIDvaccines4kids.



ما ينبغي توقعه بعد تلقي لقاح فيروس COVID-19:

ما الذي ينبغي أن أقوم به بعد تلقي اللقاح؟



انتظر من 5 إلى 15 دقيقة للتأكد من أنك بصحة جيدة. يمكن أن يُطلب منك الانتظار لمدة 30 دقيقة إن كانت هناك مخاوف بشأن احتمالية حدوث حساسية من اللقاح. خضع مقدمو اللقاحات إلى تدريبات للكشف عن الإصابة بالحساسية وتقديم رعاية فورية إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي. أخبر من يعطيك التطعيم عما إذا كان لديك تاريخ من الحساسية الخطيرة أو تعرّضت للإغماء بعد التطعيم.

أبلغ الطاقم السبري إذا شعرت بتوعلك أو ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:



الأعراض الشائعة بعد التطعيم:

قد يعاني الأطفال البالغين
سنة أعوام إلى أقل من
عامين مما يلي:


- التهيج/البكاء
- النعاس
- فقدان الشهية

مكان الحصول على اللقاح:

• الألم أو الاحمرار أو التورم
ملاحظة: يمكن حدوث ألم واحمرار وتورم في وقت لاحق
بعد تلقي اللقاح بأيام عدة. وهي أمور ليست خطيرة عادة
وستختفي من تلقاء نفسها.

الأعراض الأخرى:

- الحمى
- القشعريرة
- التعب
- الصداع
- ألم العضلات/المفاصل



المخاطر النادرة عند الحصول على لقاح فيروس Covid-19:

حدوث تفاعلات الحساسية إزاء اللقاح وغيرها من الآثار الجانبية الخطيرة أمر نادر.
بينما يبدو الأمر غير معتادًا، هناك خطر ضئيل لحدوث الحالات المرضية التالية بعد
الحصول على لقاح Covid-19: شلل بيل، أو التهاب عضلة القلب/التهاب التامور، أو
التَّاق، أو متلازمة التهابات المتعددة (MIS-C/A). اتصل بطبيبك إذا أصبت بأي من
الأعراض المذكورة أدناه. قد تظهر الأعراض في غضون أسبوع أو أكثر بعد الحصول
على اللقاح. إذا كانت أعراضك شديدة، فاتصل على الرقم 911.

- الشرى أو حكة في الجلد
- تورم الوجه أو الفم
- صعوبة في التنفس أو الصغير
- النعاس الشديد
- الحمى العالية (أعلى من 40 درجة مئوية)
- التشنجات أو النوبات الصرعية
- ضعف العضلات/فقدان الإحساس في الوجه
- ألم في الصدر أو ضيق في
- التنفس أو تعرق شديد
- الشعور بنبض قلب سريع أو خفقان أو رفرقة
- الأعراض الخطيرة الأخرى (مثل الإحساس بما يشبه وخز "الإبر" والمسامير" أو التنميل)



لمزيد من المعلومات حول لقاحات Covid-19، تفضل بزيارة halton.ca/COVIDvaccines.

