

Obtenez le vaccin contre la COVID-19

Veuillez examiner attentivement cette fiche d'information. N'hésitez pas à poser vos questions au médecin qui vous vaccinera.

Ce que vous devez savoir sur le vaccin contre la COVID-19:

- Obtenir toutes les doses recommandées du vaccin contre la COVID-19, y compris les rappels, offre une solide protection contre la maladie grave due à l'infection par la COVID-19 et diminue le nombre d'hospitalisations et de décès.
- La vaccination est recommandée même après avoir contracté la COVID-19 et pourrait renforcer la protection contre les variants actuels et futurs du virus.
- Si possible, prenez votre prochaine dose à l'intervalle recommandé. Si vous avez besoin de protection plus tôt, vous pouvez obtenir votre vaccin à l'intervalle minimal le plus court. Un intervalle plus long est recommandé car il a été démontré qu'il entraîne une meilleure réponse immunitaire par rapport à un intervalle plus court.



Pour les enfants de 6 mois à 11 ans :



- Les enfants devraient recevoir toutes les doses recommandées du vaccin contre la COVID-19. Cela est particulièrement important pour les enfants qui ont des problèmes de santé sous-jacents.
- Les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et de Moderna prévus pour les enfants utilisent une dose plus faible que les vaccins contre la COVID-19 prévus pour les adultes. Une dose plus faible fonctionne car les enfants ont une réponse immunitaire plus forte que les adultes.
- Les enfants âgés de six mois ou plus peuvent recevoir leur vaccin contre la COVID-19 en même temps, avant ou après d'autres vaccins.
- Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des ressources et des stratégies sur la façon d'aider votre enfant à se préparer à la vaccination, visitez le site halton.ca/COVIDvaccines4kids.

À quoi s'attendre après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19 :

Que dois-je faire juste après avoir reçu le vaccin?

Attendez **5-15 minutes** après avoir reçu le vaccin pour vous assurer que vous vous sentez bien. Il est possible qu'on vous demande d'attendre **30 minutes** pour détecter une éventuelle allergie au vaccin.

Les médecins qui administrent les vaccins sont formés pour dépister les allergies et fournir les soins immédiats en cas de réaction allergique. Informez le médecin qui vous administrera le vaccin de tout antécédent d'allergie grave ou d'évanouissement après la vaccination.




Dites au personnel de la clinique si vous ne vous sentez pas bien ou si un des symptômes suivants se développe :



Urticaire
(bosses sur
la peau avec
démangeaisons)



Difficultés
à respirer



Inflammation
du visage,
de la langue
ou de la gorge




Vertige

Symptômes courants après la vaccination :

La zone où le vaccin vous a été administré :

- douleur, rougeur ou gonflement

Remarque : Une douleur, une rougeur et un gonflement différés peuvent survenir plusieurs jours après la vaccination. Ce n'est généralement pas grave et cela disparaît tout seul.



Autres symptômes :

- fièvre
- frissons
- fatigue
- maux de tête
- douleurs musculaires / articulaires

Les enfants de six mois à moins de deux ans peuvent manifester les effets suivants :

- irritabilité / pleurs
- somnolence
- perte d'appétit



Risques rares liés au vaccin contre la COVID-19 :

Les réactions allergiques au vaccin et les autres effets secondaires sont rares. Bien qu'inhabituel, il existe un faible risque de développer les symptômes qui suivent après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19 : paralysie de Bell, myocardite/péricardite, anaphylaxie ou syndrome multi-inflammatoire (MIS-C/A). Contactez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes ci-dessous. Des symptômes peuvent apparaître dans la semaine qui suit la vaccination. Si vos symptômes sont graves, appelez le 911.

- urticaire ou peau qui démange
- gonflement du visage ou de la bouche
- difficultés à respirer ou respiration sifflante
- somnolence grave
- forte fièvre (plus de 40 °C)
- convulsions ou crises d'épilepsie
- faiblesse musculaire / perte de sensibilité au visage
- douleur thoracique, essoufflement ou transpiration excessive
- sensation de rythme cardiaque rapide, de palpitations ou d'arythmie cardiaque
- d'autres symptômes graves (par exemple, des « fourmillements » ou des engourdissements)



Pour plus d'informations sur la COVID-19, visitez le site halton.ca/COVIDvaccines.