À quoi s'attendre après avoir reçu un vaccin COVID-19

Que dois-je faire juste après avoir reçu le vaccin?

Attendez **15 minutes** après avoir reçu le vaccin pour vous assurer que vous vous sentez bien. Pendant cette période, n'utilisez pas de véhicule ou tout autre moyen de transport.

On peut vous demander d'attendre **30 minutes** pour détecter une éventuelle allergie au vaccin.

Dites au personnel de la clinique si vous ne vous sentez pas bien ou si un des symptômes suivants se développe :

Urticaire (bosses sur la peau avec grattelle)

Difficultés à respirer

Inflammation du visage du visage, de la langue ou de la gorge

Vertige

Quels sont les symptômes auxquels je dois m'attendre après la vaccination?



Sur le bras où vous avez reçu le vaccin :

- Douleur, Rougeur ou enflure

Remarque : une douleur, une rougeur et un gonflement différés peuvent survenir plusieurs jours après la vaccination. Ce n'est généralement pas grave et cela disparaît tout seul.

Dans le reste de votre corps :

- Fièvre
- Frissons
- Fatigue
- Maux de tête
- Douleurs musculaires/ articulaires

Quand appeler votre médecin

Les réactions allergiques au vaccin sont rares. Cependant, elles peuvent se produire jusqu'à trois jours après avoir reçu le vaccin. Contactez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes ci-dessous. Si vos symptômes sont graves, appelez le 911.

- Urticaire
- Inflammation du visage ou de la bouche
- Difficultés à respirer
- Couleur très pâle et somnolence grave
- Forte fièvre (plus de 40 °C)
- Convulsions ou crises d'épilepsie
- D'autres symptômes graves (par exemple, des « fourmillements » ou des engourdissements)

Ce qu'il faut retenir après avoir reçu le vaccin

Continuez d'appliquer les mesures de santé publique pour prévenir la propagation de la COVID-19.

- Couvrez-vous la bouche et le nez avec un masque
- Restez à au moins 2 mètres (6 pieds) les uns des autres
- Lavez-vous souvent les mains
- Isolez-vous si vous êtes malade
- Utilisez un mouchoir ou votre manche pour couvrir votre toux et vos éternuements
- Faites-vous dépister si vous avez des symptômes

Attendez au moins 28 jours **après avoir reçu votre vaccin COVID-19** pour recevoir tout autre vaccin (sauf si votre médecin le recommande).

Ne recevez aucun autre vaccin au moins 14 jours **avant de recevoir votre vaccin COVID-19.**

Obtenir votre deuxième vaccin COVID-19



Le délai entre votre première et votre deuxième dose dépend du vaccin que vous avez reçu et des directives de la santé publique.

- Conservez ce document en lieu sur ET votre reçu imprimé de vaccination COVID-19 d'aujourd'hui.
- Apportez le reçu de vaccination COVID avec vous pour votre deuxième dose de vaccin.

En savoir plus

Pour plus d'informations et de mises à jour, visitez le site **halton.ca/COVID19** ou composez le 311.



Halton REGION

Dernière mise à jour : 13 mai 2021.