

接种 COVID-19 疫苗后的重要须知

接种疫苗后, 我该怎么办?

接种疫苗后, 留下观察 **15 分钟**, 以确保您没事。在此期间, 切勿驾驶车辆或其他各类交通工具。

如果担心出现疫苗过敏反应, 则您可能需要留下观察 **30 分钟**。



倘若感觉不适或出现以下任何症状, 请告知诊所工作人员:



荨麻疹 (皮肤出现
瘙痒肿块)



呼吸困难



面部、舌头或
喉咙肿胀




头晕无力

接种后的几天内, 我的身体会有什么反应?

接种疫苗的手臂上:

- 疼痛
- 发红或肿胀



身体的其余部位:

- 发烧
- 发冷
- 疲劳
- 头痛
- 肌肉/关节疼痛




何时应致电医生

疫苗相关的过敏反应极为罕见, 且大多于接种后三天内出现。如果您出现以下任何症状, 请联系您的医生。如果您的症状较为严重, 请致电 911。

- 荨麻疹
- 面部或嘴巴肿胀
- 呼吸困难
- 面色苍白且非常困倦
- 高烧 (40 °C 以上)
- 抽搐或癫痫发作
- 其他严重症状 (例如有针刺感或身体麻痹)



接种疫苗后, 请谨记



继续遵守公共卫生措施, 以防止 COVID-19 传播。



接种每剂疫苗后 28 天内, 切勿接种其他任何疫苗 (除非您的医生建议)。

接种第二剂 COVID-19 疫苗



第一剂和第二剂的时间间隔取决于您所接种的疫苗以及公共卫生部门的指令。

- 接种的第二剂疫苗应与第一剂相同。
- 请将本材料与您今日接种疫苗时所收到的打印版 COVID-19 免疫接种收据存放在安全之处。
- 接受第二剂疫苗时, 请随身携带 COVID 免疫接种收据。

更多信息

如需获取更多信息和动态, 请访问 halton.ca/COVID19 或致电 311。

